

# Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern.

Nr. 37.

Band XVI.

Ausgegeben am 23. December 1892.

Heft 3.

Plantae Lehmannianae in Guatemala, Costa-Rica, Columbia,  
Ecuador etc. collectae.

Leguminosae.

Auctore

Marc Micheli.

I. Papilionaceae.

Trib. II. Genisteae.

*Crotalaria retusa* L., Spec. 1004.

Costa Rica; in collibus arenosis prope Limon (n. 1016). — Dec. 1881.

Ar. geog. Frequens in collibus siccis, arenosis, littoralibus regionum calidiorum utriusque orbis.

*C. anagyroides* H.B.K., Nov. Gen. VI. p. 404.

Frutex trimetralis, parce ramosus, foliis mollibus.

Columbia; in sylvis prope Popayan, 1700 m (n. 2814). — Mai 1883.

Var.  $\beta$ . minor.

Planta magis compacta, foliis pubescentibus.

Guatemala; in sylvis prope Laguna de Agance, 2000 m (n. 1720).

— Juli 1882.

Ar. geog. Species in America meridionali late diffusa.

*Lupinus bogotensis* Benth., Pl. Hartw. p. 168.

Herbaceus, foliis griseis, floribus saturate violaceis, 40 cm altus.

Ecuador; in sterilibus montis Pichincha, 4000 m (n. 396a). —

Jan. 1884.

*L. caespitosus* Benth., Pl. Hartw. p. 169.

Herbaceus, foliis griseo-viridibus, floribus dilute violaceis.

Ecuador; in sterilibus montis Pichincha, 3500—4000 m (n. 398).

— Jan. 1884.

*L. humifusus* Benth., Pl. Hartw. p. 169.

Columbia, Ecuador; in Andibus, 3000—3800 m (n. 397, 572,

626, 634). — Jan. 1884.

Obs. Species variabilis, frequens in montibus Americae centralis, meridionalis videtur; affinis *L. microphylo* Dsr. Benth., Pl. Hartw. p. 169, a quo vix satis differt.

*L. nubigenus* Kunth, Mim. p. 174. t. 50.

Nom. vernac. »Conda«; radix obliqua, planta pyramidalis, albida, floribus dilute violaceis.

Ecuador; in turfosis vulcanicis montis Pichincha, 4500 m (n. 502<sub>b</sub>).  
— Jan. 1884.

*L. pubescens* Benth., Pl. Hartw. p. 469.

Ecuador; in pascuis Cerro Majando prope Ottavale, 3000 m (n. 583).  
— Jan. 1884.

*L. Smithianus* Kunth, Mim. p. 477. t. 54.

Herbaceus, foliis lanatis, griseo-viridibus, floribus violaceis.

Ecuador; in sterilibus montis Pichincha, 4000 m (n. 399<sup>a</sup>). —  
Jan. 1884.

Omnes illae Lupini species in montibus editoribus Columbiae et Peruviae vigent et nusquam aliud repertae fuerunt.

### Trib. III. Trifolieae.

*Trifolium amabile* H.B.K., Nov. Gen. et Sp. VI. p. 503. t. 593.

Ecuador; in humidis, umbrosis prope Quito, 2800—3000 m (n. 434).  
— Nov. 1880.

Ar. geog. In America meridionali frequens.

### Trib. V. Galegeae.

*Psoralea Mutisii* H.B.K., Nov. Gen. et Sp. VI. p. 487.

Columbia; in sylvis praeclaris prope Guatica, 2200 m (n. 3860, 4046). — Febr., Aug. 1884.

*Dalea Mutisii* Kunth, Mim. p. 464. t. 47.

Columbia et Ecuador; frequens in Andibus editoribus, 2000—3300 m (n. 335<sup>a</sup>, 505<sup>a</sup>, 3527). — Oct. 1879, Jan. 1884, Feb. 1884.

*Indigofera lespedezioides* H.B.K., Nov. Gen. et Sp. VI. p. 457.

Columbia; in arenosis ad Rio Palo, 1300 m (n. 2088). — Oct. 1882.

Ar. geog. Brasilia, N. Granada, Venezuela.

*Harpalyce formosa* DC., Prodr. II. p. 523.

Frutex 0,75 m altus, foliis laete viridibus, floribus saturate sanguineis.

Guatemala; in campis nudis prope Santa Rosa, 1400 m (n. 4393).  
— Mai 1882.

Ar. geog. Passim a Mexico meridionali ad Americam centralem.

*Tephrosia cinerea* Pers., Syn. II. p. 329.

Columbia; Savanne grande, supra Neida, prov. Tolima, 500 m (n. 2343). — Dec. 1882.

Ar. geog. Species in regionibus calidioribus utriusque orbis frequens.

*Coursetia grandiflora* Benth. et Oerst., Legum. Centr. Amer. p. 7.

Frutex ramis decumbentibus vel pendulis, 3 m altus, floribus roseis.

Ecuador; in alluviis prope Quito, 2500 m (n. 584). — Jan. 1882.

*Cracca glandulifera* Benth., Pl. Hartw. p. 445.

Frutex metralis, ramosus, foliis membranaceis, floribus albidis, odoratis. Nom. vernac. »Seu«.

Columbia; in sterilibus prope Navenjo, ad Rio Dagna, 1000 m (n. 2742). — März 1883.

*C. sp. inancum.*

Ecuador; in sylvis praeclaris prope Esmeralda (n. 728).

Obs. Omnes species generum *Coursetia* et *Cracca* in America calidiori a California meridionali ad Brasiliam, praecipue in Columbia, Ecuador et Peruvia videntur.

*Sesbania longifolia* DC., Prodr. II. p. 265.

Guatemala; in sylvis claris prope Sta. Rosa, 4400 m (n. 4394). —

4. Mai 1882.

Ar. geog. Mexico, America centralis.

*Astragalus Alpamarcae* A. Gray, Un. St. Explor. I. p. 447.

Nom. vernac. Hizo, caespitosus, radice repente, floribus rubris.

Ecuador; in arenosis montis Chimborazo, 4200—4500 m (n. 442, 448). — Jan. 1884.

### Trib. VI. Hedysareae.

*Aeschynomene americana* L., Sp. Pl. 1046.

Frutex, ramis debilibus, procumbentibus, floribus luteis.

Columbia; in pratis prope Cali, prov. Cauca, 4000 m (n. 3408). — Dec. 1883.

Ar. geog. In America calidiori vulgaris.

*Stylosanthes guyanensis* Sw., Holm. 1789.

Columbia; in cultis prope Popayan, prov. Cauca, 1790 m (n. 2855).

— Apr. 1883.

Ar. geog. In America tropicali frequens.

*Zornia diphylla* Pers., Syn. II. p. 318.

Guatemala; in pratis prope Jalapa, 4500 m (n. 4652); in humidis prope Huehuetmango (n. 4526); forma rarior, undique pubescens, et foliolis late ovatis.

Columbia; in aridis, petrosis passim prope Cauca, prov. Tolima (n. 2255 et 2856). — Jun., Jul., Dec. 1882, Apr. 1883.

Obs. Specimina plurima hujus speciei in America meridionali vulgaris valde variabilia.

*Desmodium scorpiurus* Desv. in Prodr. II. p. 333.

Suffrutex prostratus, foliis saturate griseo-viridibus, floribus roseis.

Guatemala; in arenosis humidis secus Rio Polochi, 4000 m (n. 4330).

— Apr. 1882.

Ar. geog. Jamaica, Cuba, Costa Rica, Guatemala.

*D. cajanifolium* DC., Prodr. II. p. 334.

Frutex bimetralis, ramis erectis, foliis asperis, floribus lilacinis.

Columbia; in fruticetis arenosis ad Tocota, prov. Cauca, 4600 m (n. 3449). — Dec. 1883.

Ar. geog. America centralis.

*D. cuneatum* Hook. et Arn., Bot. Misc. III. p. 495.

Suffrutex 2,5 m altus, foliis rugosis, floribus dilute lilacinis.

Columbia; in fruticetis arenosis, ad Tocota, prov. Cauca, 4600 m (n. 3437). — Dec. 1883.

*D. incanum* DC., Prodr. II. p. 332.

Herbaceum, caulibus 0,35 m longis, decumbentibus, foliis griseis, floribus rubris.  
Columbia; in arenosis prope Popayan, prov. Cauca, 1800 m (n. 2058).

— Oct. 1882.

Ar. geog. In America tropicali frequens.

*D. discolor* Vog., Linn. XII. p. 403.

Suffrutex ramis decumbentibus, foliis griseo-viridibus, floribus rubris.

Columbia; in arenosis prope Tocota secus Rio Dagna, prov. Cauca, 1500 m (n. 1857). — Sept. 1882.

### Trib. VII. Vicieae.

*Vicia graminea* Sm. in Rees, Cycl.

Herba scandens, metralis, floribus caeruleo-violaceis.

Ecuador; in fruticetis montis Cotopaxi, 3000 m (n. 183). — Nov. 1880.

Ar. geog. In Americae meridionalis regionibus extratropicis frequens.

*V. andicola* H.B.K., Nov. Gen. et Sp. VI. p. 498. t. 582.

Columbia; in fruticetis prope Bogota, 2600—2900 m (n. 2459);  
Ecuador; in pratis montis Chimborazo, 3500—4000 m (n. 1154). —  
Jan. 1883.

*Lathyrus gladiatus* Hook., Ic. Pl. tab. 72.

Debilis, scandens, 50 cm altus, floribus purpureis.

Columbia; in humidis prope Pahta, prov. Cauca, 2950 m (n. 3505).  
— Feb. 1884.

### Trib. VIII. Phaseoleae.

*Centrosema Plumieri* Benth., Ann. Mus. Vind. II. p. 110.

Alte scandens, caulibus lignosis, 5 m altis, floribus albidis, rubro-striatis, odoratis.

Jamaica; in campis circa Kingston (n. 987); Columbia; in sylvis humidis secus Rio Dagna (n. 878). — Dec. 1881.

Ar. geog. Frequens in America calidiori.

*C. angustifolium* Benth. l. c. II. p. 118.

Scandens, caulibus debilibus 1,5—3 m altis, floribus albidis, violaceo-maculatis.

Jamaica; in sylvis (n. 978); Columbia; ad ripas fluminis Paez, prov. Tolima, 1000 m (n. 2222). — Dec. 1881.

Ar. geog. Frequens in America centrali et Brasilia.

*C. pubescens* Benth., Ann. Mus. Vind. II. p. 119.

Gracilis, scandens, 4 m altus, floribus saturate-violaceis.

Costa Rica, Ecuador; (n. 70, 2028). — Aug. 1880.

Ar. geog. Frequens a regno Mexicano usque ad Brasiliam.

*Clitoria guyanensis* Benth., Fl. Bras. l. c. p. 122.

Fruticosa, humilis, floribus dilute violaceis.

Columbia; in pratis prope Condoí, prov. Tolima, 600 m (n. 2564).  
— Feb. 1883.

Ar. geog. Brasilia, Guyana, Columbia.



**C. ternatea** L., Spec. 4026.

Alte scandens, foliis mollibus, floribus caeruleis.

Costa Rica; in campis prope Punta Arenas (n. 1734). — Jul. 1882.

Obs. In regionibus calidioribus frequens et saepe culta.

**C. javitensis** Benth. in Journ. Linn. Soc. II. p. 122.

Scandens, caulibus elongatis, foliis coriaceis, floribus albidis, rubro-notatis.

Columbia; in fruticetis secus Rio Dagna, prov. Cauca, 500 m (n. 70<sup>a</sup>).

— Mai 1885.

Ar. geog. America centralis.

**Cologania ovalifolia** H.B.K., Nov. Gen. et Sp. VI. p. 412.

Herba volubilis, bimetralis, floribus violaceis.

Columbia; in fruticetis Val. Pasto, 2800 m, prope Pasco in prov.

Cundinamarca, 2400 m (n. 556, 2519). — Febr., März 1881.

Ar. geog. Species in Bolivia obvia, *C. pulchellae* sp. mexicanae imprimis affinis, forsitan eadem species.

**Erythrina Amasisa** Spruce in Sched. herb. Kew.

Nom. vern. Ama-Sisa; alias Cochimbo; arbor 30 metralis, ad plantas Coffeae adumbrandas saepe culta.

Columbia; prov. Cauca, 4000 m (n. 3046). — Aug. 1883.

Species carina et vexillo fere aequalibus insignis.

**Mucuna rostrata** Benth., Fl. Bras. l. c. p. 171.

Alte scandens, foliis saturate viridibus, coriaceis.

Columbia; prov. Tolima in sylvis secus Rio Timana, 4000 m (n. 2293).

— Dec. 1882.

Ar. geog. Crescit etiam in Brasilia boreali.

**M. mollis** DC., Prodr. II. p. 405.

Nomen vern.: »Pica Pica«; frutex scandens, trimetralis, floribus violaceis, fructibus pilis urentibus praeditis.

Columbia occidentalis; Kanja, 900 m (n. 770). — Jul. 1881.

**Galactia marginalis** Benth., Ann. Wien. Mus. II. p. 127.

Nom. vern.: »Imperiosa«; caules 0,15 m longi, flores violacei.

Guatemala; in diluvio prope Chimaltenango, 4800 m (n. 1496).

Columbia; prov. Cauca, in argillosis rubris prope Tacuayo, 4600 m (n. 2049). — Jun., Oct. 1882.

Ar. geog. Texas, Mexico, Argentina, Uruguay, Paraguay.

**Dioclea reflexa** Hook. fil., Fl. Nigr. p. 306.

Scandens, 8 m alta, foliis coriaceis, floribus pulchro-lilacinis.

Columbia; prov. Cauca, in sylvis secus Rio Dagna, 300 m (n. 2760).

— März 1883.

Ar. geog. In America meridionali frequens; in Africa et Asia tropicali quoque obvia.

**D. lasiocarpa** Benth., Ann. Wien. Mus. II. p. 133.

Scandens, 40 m alta, floribus dilute violaceis, fragrantibus.

Ecuador; secus Rio Esmeralda (n. 734). — Jul. 1881.

Ar. geog. Species in Guyana, Surinam, Brasilia, Peruvia obvia.

**D. lasiophylla** Benth., Fl. Bras. l. c. p. 466.

Scandens, ramis debilibus, floribus violaceis.

Columbia; prov. Cauca, in vallibus, secus flumine, 400—1400 m (n. 787, 2875). — Jul. 1884, Mai 1883.

Ar. geogr. Etiam in Brasiliae prov. Bahia et Goyaz crescit.

**Canavalia gladiata** DC., Prodr. II. p. 404.

Jamaica; in collibus (n. 983). — Dec. 1883.

Ar. geog. In America meridionali calid. late diffusa.

**Phaseolus speciosus** H.B.K., Nov. Gen. III. p. 452.

Herbaceus, caulibus debilibus scandentibus, 5 m altis, floribus dilute lilacinis, leguminibus angustis.

Columbia; in fruticetis prope Popayan, 1700 m (n. 854, 2056). — Aug. 1882, Oct. 1882.

Ar. geog. America centralis, a Mexico ad Columbianam et Ecuador.

**Ph. linearis** H.B.K., Nov. Gen. VI. p. 445.

Caulibus scandentibus, 30 cm altis, floribus violaceis.

Columbia; in arenosis secus Rio Paez, prov. Tolima, 1000—1400 m (n. 2221). — Nov. 1882.

Ar. geog. America tropicalis passim; Surinam, Guyana, Columbia.

**Ph. semierectus** L., Spec. 4016.

var.  $\beta$ . *angustifolius*.

Caulibus debilibus, procumbentibus, floribus dilute fulvo-rubris.

Columbia; in arenosis prope Neira, prov. Tolima, 300—500 m (n. 2372). — Jan. 1883.

Ar. geog. America meridionalis, passim.

**Ph. parviflorus** Schl. in Linn. XII. p. 325.

Herbaceus; caulibus debilibus, 20 cm longis, foliis glaucis, floribus rubris.

Guatemala; in pratis prope Jalapa, 1500 m (n. 1653). — Jul. 1882.

**Vigna** sp.?

Specimen mancum, accuratius non determinandum.

Columbia; in hortis prope Santa-Rosa culta (n. 3887). — Sept. 1882.

**Rynchosia macrocarpa** Benth., Pl. Hartw. p. 44.

Herbacea, scandens, caulibus debilibus, 6 m altis.

Columbia; in fruticetis circa Cali, prov. Cauca, 1000—1200 m (n. 2861). — Mai 1883.

Ar. geog. America centralis a Mexico merid. ad Peruviam, passim.

**Eriosema violaceum** G. Don, Gen. Syst. II. p. 347.

Herbaceum, caulibus ramosis, 40 cm altis.

Columbia; in arenosis secus Rio Sato, prov. Cauca, 1500 m (n. 2059). — Oct. 1882.

Ar. geog. In America merid. frequens.

**E. diffusum** G. Don, Syst. II. p. 347.

Frutex humilis, foliis cinereis, floribus dilute luteis.

Guatemala; ad oras sylvae S. Maria, 1500 m (n. 1558). — Jun. 1882.

Ar. geog. In America centrali frequens.

II. *Caesalpinieae*.

*Poinciana pulcherrima* DC., Prodr. II. 484.

Costa Rica; culta in hortis prope Puerto Lemon (n. 1044). — Dec. 1884.

Ar. geog. Mexico, America centralis, America meridionalis tropica, saepe culta.

*Parkinsonia aculeata* L., Hort. Cliff. p. 167. t. 13.

Arbor 5 m altus, floribus luteis.

Columbia; in valle flum. Dagna (n. 2927). — Jul. 1883.

Ar. geog. In America calidiore, Antillis etc. frequens; in Asia et Africa saepe culta.

*Cassia macrophylla* Kunth, Mim. p. 126. t. 38.

Arbor 5 m alta.

Columbia; in campis et secus rivulos, prov. Tolima, Cauca, 1000 — 1300 m (n. 3286, 2957, 2233). — Aug. 1883.

Ar. geog. Species in Brasilia centrali et australi, nec non in Columbia, Ecuador obvia.

*C. bicapsularis* L., Spec. Pl. 538.

Guatemala; in sylvis praeclaris, 1400 m (n. 1439); Ecuador; prope Esmeralda (n. 727). — Apr., Juli 1882.

Ar. geog. Per Americam calidiorem late diffusa.

*C. laevigata* Willd., Enum. Hort. Berol. 444.

Guatemala; in sylvis prope Coban, 1300 m (n. 1413). — Mai 1882.

Ar. geog. In Mexico, America centrali et Brasilia late diffusa.

*C. tomentosa* L. f., Supp. 234.

Ecuador; frequens in Andibus, 1800—3000 m (n. 935). — Aug. 1884.

Ar. geog. In America centrali frequens.

*C. spectabilis* DC., Cat. Hort. Monsp. 90.

Columbia; in valle flum. Dagna, 500 m (n. 963). — Sept. 1884.

Ar. geog. America tropicalis et centralis.

*C. occidentalis* L., Spec. Pl. 539.

Costa Rica; in arenosis prope Puerto Limon (n. 1013). — Dec. 1884.

Ar. geog. Frequens in campis calidioribus utriusque orbis.

*C. hispidula* Vahl, Ecl. III. 10.

Guatemala; in sylvis clavis secus flum. Paz (n. 1665). — Jul. 1882.

Ar. geog. America centralis usque ad Mexico, et passim in Brasilia.

*C. uniflora* Spreng., Neue Entd. I. 294.

Columbia; frequens in sylvis prov. Tolima, 800 m (n. 2542). — Feb. 1882.

Ar. geog. In America tropica frequens.

*C. rotundifolia* Pers., Syn. I. p. 456.

var.  $\gamma$ . *grandiflora*.

Columbia; in arenosis prope Neira, in prov. Cauca, 400 m (n. 2373). — Jan. 1883.

Ar. geog. Frequens in Brasilia et in America centrali.

**C. flavicoma** H.B.K., Nov. Gen. et Sp. VI. p. 366.

Columbia; frequens in campis prov. Cundinamarca, 1800—2600 m (n. 2505). — Jan. 1883.

Ar. geog. In Columbia et Peruvia late diffusa.

**Bauhinia Cumanensis** H.B.K., Nov. Gen. et Sp. VI. p. 321.

Columbia; in regione calidiori secus flum. Magdalena, 350—1000 m (n. 2577). — Feb. 1883.

Ar. geog. America tropicalis, Brasilia.

**B. porrecta** Swartz, Prodr. p. 66.

Jamaica; in montibus (n. 986). — Dec. 1881.

Ar. geog. America tropicalis, Jamaica.

**Brownea ariza** Benth., Pl. Hartw. p. 171.

Sine loco accuratius indicato; Nomen vernac. »Flor de la Cruz« (n. 3038).

### III. Mimoseae.

**Mimosa sensitiva** L., Spec. 1504.

Columbia; frequens in sylvis praeclaris et arenosis prov. Cauca et Tolima, 1000—2000 m (n. 842, 2187, 3079); Ecuador; prope Quito (n. 440). — Jan. 1880.

Ar. geog. In America tropicali et Brasilia frequens.

**M. pudica** L., Spec. 1504.

Columbia; in arenosis humidis prope Cali, 1000 m (n. 3413). — Dec. 1883.

Ar. geog. Crescit vulgatissima in America calidiori.

**M. in visa** Mart., Herb. Fl. Bras. p. 121.

Columbia; prope Tocota (n. 4082).

Ar. geog. In America calidiori late diffusa.

**Leucaena glauca** Benth. in Hook., Journ. Bot. IV. p. 116.

Arbor 5 m.

Columbia; in sylvis prope La Plata, prov. Tolima, 1000 m (n. 2268). — Dec. 1882.

Ar. geog. In regionibus calidioribus utriusque orbis late diffusa, sed saepe culta.

**Acacia adhaerens** Benth. in Hook., London Journ. I. p. 517.

Nom. vernac. »lluarango«.

Columbia; frequens in valle flum. Cauca, in declivibus siccis, 500—2500 m (n. 924). — Aug. 1881.

Ar. geog. In America tropicali et Brasilia frequens.

**Lysiloma acupulcensis** Benth. in Hook., Lond. Journ. III. p. 83.

Guatemala; ad oras sylvarum 1200 m (n. 1317). — Apr. 1882.

Ar. geog. In Mexico et America centrali.

**Calliandra carbonaria** Benth. in Hook., Lond. Journ. III. p. 95.

Arbor 4 m alta, parce ramosa.



Columbia; frequens ad rivulos prope Popayan, Cauca, Tolima (n. 2089, 4070). — Oct. 1882.

Ar. geog. Peruvia, Columbia, Costa Rica.

**Pithecolobium ligustrinum** Klotzsch in Herb. Berol.

Nom. vernac. »Chiminango«, arbor 8 m alta, floribus albidis, odoratis.

Columbia; in sylvis praeclaris vallis Cauca prope Carthago, 6—1300 m (n. 3875). — Aug. 1884.

Ar. geog. America centralis, Venezuela, Columbia.

**P. dulce** Benth. in Hook., Lond. Journ. III. p. 199.

Arbor 10 m alta, parce ramosa, floribus albidis.

Columbia; in aridis secus flum. Dagna, 400 m (n. 950). — Sept. 1884.

Ar. geog. frequens in America centrali.

**P. unguis-cati** Benth. in Hook., Journ. III. p. 200.

Nom. vernac. »Dinde«.

Columbia; in valle flum. Dagna, 1200 m (n. 2935). — Jul. 1883.

Ar. geog. America tropicalis: Ind. Occid., Venezuela; Columbia.

**P. sp. forte nova affinis** *P. macrophylo*.

Specimen mancum.

Columbia; in sylvis humidis prope Inza (n. 2494). — Nov. 1882.

**Inga panurensis** Benth. in Mart., Fl. Bras.

Arbor 5 m alta, foliis coriaceis, nitidis.

Columbia; in sylvis densis prov. Cauca (n. 3824). — Aug. 1884.

Ar. geog. Species in herbariis rara, a Brasilia boreali orta.

**I. marginata** Willd., Spec. IV. 4045.

Arbor 10 m alta.

Columbia; in sylvis prope Sta. Rosa, Cauca (n. 3055). — Sept. 1883.

Ar. geog. Peruvia, Venezuela, Brasilia.

**I. nobilis** Willd., Enum. Hort. Berol. p. 4047.

Columbia; in pratis umbrosis prope Popayan, 1500—1800 m (n. 829). — Aug. 1884.

Ar. geog. In America tropica late diffusa.

**I. vera** Willd., Spec. IV. p. 4040.

Columbia; frequens et saepe culta (n. 778, 906).

**I. specimen mancum**, accuratius non determinandum (n. 4004).